

# Снижение цены на препарат Бетмига®


# %

## Бетмига®/ мирабегрон 50 мг

№ 10, № 30 (МНН: *мирабегрон*, лекарственная форма: таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой)<sup>1</sup>



**-30%**



Осознавая социальную ответственность за доступность препаратов для пациентов, особенно в текущее непростое время, компания АО «Астеллас Фарма» приняла решение о **снижении цены на 30% на препарат Бетмига®**

**Бетмига® – первый и единственный на сегодняшний день на российском рынке представитель класса агонистов  $\beta_3$ -адренорецепторов<sup>1</sup>, рекомендованный в качестве 1-й линии терапии гиперактивного мочевого пузыря, сопоставимый по эффективности с антимускариновыми препаратами, но превосходящий их по профилю безопасности<sup>2</sup>**



### Снижает частоту недержания

мочи на **87%\***<sup>3</sup>



### Снижает число мочеиспусканий

на **57%\***<sup>3</sup>



### Профиль безопасности *мирабегрона* эквивалентен плацебо<sup>2,4</sup>



### Не оказывает влияния на когнитивную функцию<sup>5</sup>

подходящий вариант для лечения ГМП у пожилых пациентов со множественными сопутствующими заболеваниями



### Пациенты с ГМП в 2 раза более привержены лечению, если принимают **БЕТМИГУ**, а не м-холинолитики<sup>6</sup>

\* По сравнению с плацебо.

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Бетмига, РУ: ЛП-002851 от 06.02.2015; URL: [www.grls.rosminzdrav.ru](http://www.grls.rosminzdrav.ru).

2. Burkhard (Chair) F.C., et al. EAU Guidelines on Urinary Incontinence 2020. Доступны на [www.uroweb.org](http://www.uroweb.org).

3. Адаптировано из: Nitti V., et al. Poster presented at the 37th Annual Meeting of IUGA. September 2012, Brisbane, Australia. Poster 351.

4. Christopher R. Chapple, Francisco Cruz, Linda Cardozo. Safety and Efficacy of Mirabegron: Analysis of a Large Integrated Clinical Trial Database of Patients with Overactive Bladder Receiving Mirabegron, Antimuscarinics, or Placebo. EUROPEAN UROLOGY. 2020; 77: 119–128.

5. Wagg A., et al. Efficacy, safety, and tolerability of mirabegron in patients aged > 65 yr with overactive bladder wet: a phase IV, double-blind, randomised, placebo-controlled study (PILLAR). EUROPEAN UROLOGY. 2020; 77: 211–22.

6. Chapple C.R., et al. Eur. Urol. 2017; 72: 389–99. Приверженность терапии мирабегроном в сравнении с антимускариновыми препаратами у пациентов с ГМП: данные ретроспективного наблюдательного исследования в Великобритании в клинической практике, при участии 21 996 пациентов старше 18 лет, в период с 1 мая 2013 по 29 июня 2014г.

BET\_2020\_0048\_RU\_NOV\_2020\_POSTSCRIPTUM

АО «Астеллас Фарма»  
109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 16  
Тел. +7 (495) 737-07-56

 **astellas**

Вы получили это письмо, т.к. подписаны на рассылку. Чтобы отказаться от этой рассылки, перейдите по [ссылке](#).  
Информация предназначена для медицинских работников. Для получения дополнительной информации о том, как мы защищаем Ваши персональные данные и как Вы можете реализовать своё право на защиту данных, ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности [здесь](#).