

# Визанна способствует уменьшению всех видов боли при эндометриозе




\* Статистически достоверные изменения

Представлены данные полного анализа, исключены пациентки, данные по которым отсутствовали.


Köhler G, et al. Int J Gynaecol Obstet. 2010; 108:21–25.

# Визанна эффективно купировала боль в течение 36 месяцев как у пациенток после операции, так и у пациенток без операции



ВАШ – визуально – аналоговая шкала

# Частота безрецидивных случаев после проведения различной послеоперационной терапии (эндометриома)



Логарифмический ранговый критерий,  $\chi^2 = 10.785$ ;  $P < 0,01$

95% ДИ, 0,014-0,769

Диеногест 2 мг 0%

Диеногест 1 мг 9%

КОК 9%

Отсутствие лечения  
38%

Через **50 месяцев** после операции не отмечено ни одного случая рецидива эндометриомы при приеме диеногеста 2 мг, у 9% при приеме диеногеста 1 мг (1/2 табл). При этом при приеме КОК рецидивы наблюдались примерно в 10% случаев и у 38% при отсутствии противорецидивной терапии.

ДИ – доверительный интервал, КОК – комбинированные оральные контрацептивы

Y. Ota, Kurashiki, Japan. Postoperative treatments with progestins and prevention of endometriosis recurrence: effectiveness of dienogest and combined oral contraceptives (COCs), VIII International Congress on Reproductive Medicine, Jan, 2014.


# Визанна представляется оптимальным методом терапии вновь рецидивировавших эндометриом и позволяет избежать повторной операции



Визанна продемонстрировала значимое снижение объема эндометриом

\*адаптировано из постерного доклада Dr. Kim и соавт. «Влияние терапии препаратом Визанна на размеры эндометриомы». SEUD 2017

# Визанна является эффективным препаратом для долговременной терапии аденомиоза, эффективно купируя боль и кровотечения



Через год после терапии аденомиоза Диеногестом 2 мг наблюдались<sup>2</sup>:

- Снижение показателей боли по ВАШ в среднем на **86%**
- Уменьшение размера матки на **30%**


■ ВАШ (мм)

■ Объем матки (см³)

**57% женщин отметили аменорею**


Визанна 

# Даже кратковременное применение диеногеста 2 мг продемонстрировало сопоставимую с агонистами эффективность в отношении всех видов болей при аденомиозе



# У женщин с аденомиозом, получавших препарат Визанна перед процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), чаще наступала беременность (даже при запущенных формах)

Частота наступления беременности в результате ЭКО у женщин с аденомиозом




\*Вартанян Э.В. и др. Консервативная терапия эндометриоза при подготовке к лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения. Гинекология Эндокринология. 2015, № 1 (102), 21-25.  
Vartanyan E. et al. Endometriosis management prior to IVF. Gyn Endocrinol. 2015; 21 (sup 1): 42-45.

\*\*Kuivasaari P, et al. Effect of endometriosis on IVF/ICSI outcome: stage III/IV endometriosis worsens cumulative pregnancy and live-born rates. Hum Reprod. 2005; 20 (11): 3130-5.

# Применение диеногеста 2 мг перед ЭКО в 2.5 раза повышает частоту беременности по сравнению с отсутствием медикаментозной коррекции

Проспективное когортное исследование с участием 144 женщин после лапароскопического удаления эндометриом, планирующих беременность по программе ЭКО



Назначение **ДНГ 2 мг в 2.5 раза** повышает вероятность беременности и **в 3 раза** частоту родоразрешений по сравнению с отсутствием лечения, что превышало показатели аГнРГ

аГнРГ – агонисты релизинг - гормонов

Визанна 



# Визанна продемонстрировала сопоставимую эффективность для лечения бесплодия при эндометриозе, как и аГнРГ<sup>1</sup>

Комбинированное лечение бесплодия у пациенток с эндометриозом с применением хирургического метода (коагуляция и иссечение очагов эндометриоза) с последующим назначением аГнРГ или диеногеста показало эффективность у 1/3 пациенток и не имело различий в зависимости от варианта медикаментозной терапии.

Однако пациентки, получившие аГнРГ, в 2 раза чаще имели неразвивающуюся беременность. А также на аГнРГ было значительно больше побочных эффектов.

**Таким образом, для инфертильных пациенток, страдающих эндометриозом, более безопасным подходом является применение комбинированного метода лечения с использованием 2 мг диеногеста**